




# شرکت مزرعه فرار آسمان

وارد کننده نهاده های کشاورزی

## برنامه غذایی سیب زمینی



تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۴۵۴۰۵

فکس: ۰۲۱-۴۴۲۴۴۹۰۲

سایت: [www.farazeaseman.com](http://www.farazeaseman.com)

ایمیل: [info@farazeaseman.com](mailto:info@farazeaseman.com)

آدرس: تهران، بزرگراه آیت... اشرفی اصفهانی، بلوار مرزداران، پلاک ۹۹



کود جایگزین	نحوه و میزان مصرف		نوع کود	زمان مصرف
	کود آبیاری	محلول پاشی		
کود دامی پوسیده	۱۵۰۰-۵۰۰ کیلوگرم / هکتار (در مناطق شور با احتیاط مصرف شود)		کود مرغی	قبل از کاشت (اختلاط با خاک)
هلیو هیومیک مستر بلک مامبا	۵-۱۰ لیتر / هکتار		هیومیفیر	همراه با اولین آبیاری
مستر جوکر ۲۰-۲۰-۲۰ اسپشیل ان پی کی ۲۰-۲۰-۲۰	۱۲-۲۰ کیلوگرم / هکتار		مستر کد ۲۰-۲۰-۲۰	<p>پس از سبز شدن بوته ها</p>
		۱-۲ لیتر / هکتار	آلگوماکس	
	۱۰-۱۵ کیلوگرم / هکتار		اوره فسفات	<p>پس از خاکدهی پای بوته ها</p>
هلیو هیومیک مستر بلک مامبا	۵-۱۰ لیتر / هکتار		هیومیفیر	
		۲-۴ لیتر / هکتار	مستر سورتی	
	۶-۸ کیلوگرم / هکتار		نیترات کلسیم	
مستر جوکر ۱۰-۴۰-۱۰ اسپشیل ان پی کی ۱۰-۵۲-۱۰	۱۲-۲۰ کیلوگرم / هکتار		مستر کد ۱۰-۴۰-۱۰	<p>قبل از گلدهی</p>
		۰/۷-۱ کیلوگرم / هکتار	مستر دبل میکسچر	
هلیو هیومیک مستر بلک مامبا	۵-۱۰ لیتر / هکتار		هیومیفیر	
مستر جوکر ۱۲-۳-۴۳ مستر کد ۱۰-۱۰-۴۰	۱۲-۲۰ کیلوگرم / هکتار		اسپشیل ان پی کی ۱۵-۵-۳۰	<p>بعد از گلدهی</p>
نیترات کلسیم آلفا کلسیم	۶-۸ لیتر / هکتار		مستر نیتروکا	
	۱۰-۱۵ کیلوگرم / هکتار		سولفات پتاسیم	<p>رسیدگی غده</p>

جهت اطلاع از میزان مصرف کودهای جایگزین به کاتالوگ شرکت مراجعه شود .

لازم به ذکر است این برنامه غذایی با توجه به شرایط اقلیمی و نحوه مدیریت مزرعه امکان تغییر داشته و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش نمایید . در صورتی که عدم توجه به این موضوع و استفاده نادرست از کودها منجر به خسارت شود، مسئولیتی متوجه شرکت های تولید کننده و وارد کننده نخواهد بود .

«در صورت نیاز به اختلاط، حتما تست اختلاط انجام شده و با کارشناسان شرکت مشورت نمایند.»

در صورت نیاز به مصرف آلگوماکس به صورت کود آبیاری، آن را به میزان ۳-۵ لیتر در هکتار مصرف نمایند.

در صورت نیاز به مصرف مستر سورتی به صورت کود آبیاری، آن را به میزان ۳-۷ لیتر در هکتار مصرف نمایند.

